

ÖKORON® 5 AHC

Desinfektion für die Tierhaltung und den Lebendviehtransport

- *Wirksam gegen die afrikanische Schweinepest, Maul- und Klauenseuche (MKS), Vogelgrippe (H5N8)*
- **Bakterizid** geprüft nach EN 1656 / EN 14349
- **Fungizid** geprüft nach EN 1657 / EN 16438
- **Mykobakterien** geprüft nach EN14204
- **Viruzid** geprüft nach 14675
- **keine Resistenzerscheinungen**
- **wirksam ab + 5 °C**



Produktbeschreibung

ÖKORON® 5 AHC ist ein saures, verschäumbares Flächendesinfektionsmittel mit reinigender Wirkung und einem umfangreichen bioziden Wirkungsspektrum. Bereits bei niedrigen Temperaturen ($\pm 5^\circ\text{C}$) ist ÖKORON® 5 AHC für die Bereiche Tierhaltung und Lebendviehtransport einsetzbar.

Aggregatzustand	wasserklare Flüssigkeit
pH-Wert [1;0 %-ige Lsg. bei 20°C]	3,0 – 3,4
Dichte [g/cm ³ bei 20 °C]	1,103 – 1,117
Leitwert [µS/cm für eine 1%-ige Lsg. bei 20°C]	220 – 260
P-Wert [1;0 %-ige Lsg ml 0,1 N NaOH / 10 ml]	2,2 – 2,6

Inhaltsstoffe

Peroxyessigsäure (PES), Wasserstoffperoxid, organische Säuren, nichtionische Tenside, Stabilisatoren

Wirkungsweise

ÖKORON® 5 AHC zerstört oxidativ Funktionselemente der Mikroorganismen und inaktiviert deren Enzymsystem. Der unspezifische Wirkungsmechanismus verhindert die Ausbildung von Resistenz und ist die Grundlage der effektiven bioziden Wirkung. Die in ÖKORON® 5 AHC enthaltenen Tenside erleichtern die Anwendung und unterstützen die Wirkung des bioziden Wirkstoffsystems.

Anwendungsempfehlung

ÖKORON® 5 AHC besitzt bakterizide, fungizide und viruzide Wirksamkeit. Die Anwendungskonzentration wird durch die Anwendungsbedingungen (Temperatur, Einwirkungszeit) und die abzutötenden Mikroorganismen bestimmt. Folgende Richtwerte sollten bei der Anwendung als Maßstab dienen:

Stalldesinfektion + Equipment

Temperatur	Einwirkungszeit	Konzentration ÖKORON® 5 AHC	PES
10 °C	30 Minuten	0,6 – 5,0 %	300 – 2500 ppm

Desinfektion von Tiertransportern (Durchfahrbecken)

Temperatur	Einwirkungszeit	Konzentration ÖKORON® 5 AHC	PES
10 °C	5 Minuten	0,8 – 4,0 %	400 – 2000 ppm

Stiefeldesinfektion

Temperatur	Einwirkungszeit	Konzentration ÖKORON® 5 AHC	PES
	1 Minuten	4,0 %	2000 ppm

Klauendesinfektion

Temperatur	Einwirkungszeit	Konzentration ÖKORON® 5 AHC	PES
10 °C	5 Minuten	2,0 – 7,0 %	1000 – 3500 ppm

Tränkwasser-Desinfektion

	Konzentration ÖKORON® 5 AHC	PES
Zwischendesinfektion	0,2 %	100 ppm
Kontinuierlich	0,06 %	30 ppm

Anwendung im Seuchenfall:

Temperatur	Einwirkungszeit	Konzentration ÖKORON® 5 AHC	PES
20°C	60 Minuten	2,0 %	1000 ppm

Weitere biozide Wirksamkeiten von **ÖKORON® 5 AHC** sind im Anhang aufgeführt!

Materialverträglichkeit

ÖKORON® 5 AHC kann in der Anwendungskonzentration unter Beachtung der DIN 11 483, Teil 1, zur Desinfektion von Oberflächen aus Edelstahl, aber auch von Kunststoffen, wie Polyethylen und -propylen, Munkadur, PVC, NBR und EPDM verwendet werden. Bei der Desinfektion von Oberflächen aus Messing und Kupfer sind längere Kontaktzeiten wegen der Gefahr von Verfärbungen zu vermeiden.

ÖKORON® 5 AHC kann nicht zur Desinfektion von Flächen aus Kalk, Zement und Marmor verwendet werden.

Schaumverhalten

ÖKORON® 5 AHC ist eine Zubereitung mit schäumenden Tensiden. Ein Verschäumen von **ÖKORON® 5 AHC** verlängert die Einwirkungszeit, kennzeichnet die desinfizierten Flächen und verbessert die biozide Wirksamkeit.

Lagerhinweis

ÖKORON® 5 AHC vor direktem Sonnenlicht geschützt und nicht bei Temperaturen oberhalb 35 C lagern.
Frostempfindlich ab - 5 °C.

FINK TEC GmbH
D-59069 Hamm, Oberster Kamp 23
Tel.: +49 (0)2385 / 73-0 / Fax +49 (0)2385 / 73-349

Der Text dieser Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen und soll Sie nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Er ist jedoch aufgrund der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften.

Anhang: Wirksamkeiten

B = Bakterizid
P = Bakteriophagen

Y = Levurozid
V = Viruzid

F = Fungizid
M = Mykobakterizid
S = Sporizid

PT3: Stalldesinfektion + Equipment

Technologie: Sprühen: 200 ml Produkt / m²
Verschäumen; Dipping

Wischen: 20 ml Produkt / m²

	Wirksamkeitstest	Zeit / min	Temperatur / °C	Konzentration PES (100 %)	Konzentration Ökoron® 5 AHC / %
B	EN1276	30	10	150 ppm	0,3
B	EN14349	30	10	300 ppm	0,6
Y	EN1657	30	10	150 ppm	0,3
Y	EN16438	30	10	300 ppm	0,6
F	EN1657	30	10	2000 ppm	4,0
F	EN16438	30	10	2500 ppm	5,0
M	EN14204	30	10	250 ppm	0,5
V	EN14675 Bovine Parvovirus; Klassische Schweinepest; Afrikanische Schweinepest Aujeszký-Virus, Vesikuläre Schweinekrankheit; Maul- und Klauenseuche ECBO-Virus	30	10	750 ppm	1,5
V	Porcine Respiratory & Reproductive syndrome (PRRS), Avian InfluenzaA (H3N2), Vogelgrippe (H5N8) Influenza A virus, Trichophyton Mentagrophytes, Vesicular stomatitis virus (VSV), Rhinovirus, Infectious bursal disease (IBDV), Newcastle disease, infectious bovine rhinotracheitis	10	20	150 ppm	0,3

PT3: Desinfektion von Ställen

Technologie: Vernebelung 3 – 6 ml **Ökoron® 5 AHC** / m³

	Wirksamkeitstest	Zeit / min	Temperatur / °C	Konzentration PES (100 %)	Konzentration Ökoron® 5 AHC / %
	NF T 72-281	15 – 120	Raumtemperatur	4000 ppm	8,0

PT3: Desinfektion von Tiertransportern

Technologie: Sprühen, Tauchen

	Wirksamkeitstest	Zeit / min	Temperatur / °C	Konzentration PES (100 %)	Konzentration Ökoron® 5 AHC / %
B	EN1656	5	10	150 ppm	0,3
B	EN14349	5	10	750 ppm	1,5
Y	EN1657	5	10	400 ppm	0,8
Y	EN16438	5	10	400 ppm	0,8
F	EN1657	5	10	2000 ppm	4,0
F	EN16438	5	10	2000 ppm	4,0
M	EN14204	5	10	1000 ppm	2,0
V	EN14675 Bovine Parovirus	5	10	1000 ppm	2,0

PT3: Stiefeldesinfektion

	Wirksamkeitstest	Zeit / min	Temperatur / °C	Konzentration PES (100 %)	Konzentration Ökoron® 5 AHC / %
V	EN14675	1		2000 ppm	4,0

PT3: Klauendesinfektion

	Wirksamkeitstest	Zeit / min	Temperatur / °C	Konzentration PES (100 %)	Konzentration Ökoron® 5 AHC / %
B	EN1656 EN16437	5	10	3250 ppm	6,5
Y	EN1657 EN16438	5	10	400 ppm	0,8
F	EN1657 EN16438	5	10	3500 ppm	7,0
M	EN14204	5	10	1000 ppm	2,0
V	EN14675 (Bovine)	5	10	1000 ppm	2,0